

ITAMITRAUMAp^{plus}® Emulsione gel

a base di glicosaminoglicani (GAG) ed estratto di Boswellia serrata

Tube da 50 g

Informazioni sul prodotto

ITAMITRAUMAp^{plus} è una preparazione topica costituita da una miscela di glicosaminoglicani GAG (acido ialuronico e condroitin solfato), polimeri con particolare affinità per l'acqua, e estratto di Boswellia serrata. Grazie alle proprietà dei glicosaminoglicani, ITAMITRAUMAp^{plus} è in grado di richiamare le molecole d'acqua riducendo pertanto la massa liquida degli spazi extracellulari che è la principale componente dell'edema (liquido extravasale costituito da siero, plasma, sangue). Il riassorbimento dell'edema con conseguente riduzione di gonfiore, infiammazione e dolore, esplica un effetto lenitivo dando una sensazione di sollievo e benessere.

Composizione

Componenti principali: miscela di GAG 0,5% (condroitin solfato sale sodico 0,25%, acido ialuronico sale sodico 0,25%) ed estratto di Boswellia serrata 3%.

Altri componenti: Dicaprilil etere, Glicerolo, Gliceril stearato, PEG-100 stearato, Etanolo, Ammonio Aciriloildimetiltaurato/VPCopolimero, 1,2- Esandiolo, Caprilil glicole, Alcool cetilstearylco, Etossidiglicole, Dimeticone, Gomma Xantana, Sodio benzoato, Potassio sorbato, EDTA bisodico, Lecitina, Tocoferolo, Ascorbil palmitato, Acido citrico, Acqua purificata.

Indicazioni

ITAMITRAUMAp^{plus} emulsione gel è indicato per il trattamento di edemi localizzati derivanti da ematomi, traumi, distorsioni e contusioni. Grazie alle proprietà idrofiliche dei suoi componenti facilita il processo di assorbimento dell'edema nei tessuti molli e migliora la sintomatologia dolorosa della zona.

Posologia e modalità somministrazione

Applicare ITAMITRAUMAp^{plus} emulsione gel sulla zona interessata con un massaggio delicato fino a completo assorbimento, tre o quattro volte al giorno. ITAMITRAUMAp^{plus} emulsione gel non unge e non macchia.

Controindicazioni

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti del prodotto.

Avvertenze e precauzioni

La emulsione gel deve essere utilizzata su cute integra lontano dagli occhi.

Non usare il prodotto oltre i ventiquattro mesi dall'apertura del tubo.

Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.

Richiudere il contenitore dopo ogni applicazione.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato correttamente.

Dopo l'uso eliminare secondo le norme nazionali vigenti.

Non usare il prodotto assieme a saponi/detergenti a base di sali di ammonio quaternario.

Se dopo 15 giorni di trattamento non si percepiscono sensibili miglioramenti, si consiglia di rivolgersi al proprio medico.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Effetti indesiderati

Non sono note reazioni avverse con prodotti topici a base di miscela di glicosaminoglicani (acido ialuronico e condroitin solfato) e da estratto di Boswellia serrata.

Conservazione

Conservare nella confezione originale a temperatura non superiore a 25°C. Non congelare.

Presentazione

Astuccio contenente un tubo da 50g di emulsione gel.

Le istruzioni per l'uso sono incluse nell'astuccio.

Fabbricante

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano terme (Padova), Italia



Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo: Novembre 2016



Periodo post apertura



Consultare le istruzioni per l'uso



Utilizzare Entro

LOT

Codice del lotto



Non utilizzare se la confezione è danneggiata



Limiti di Temperatura



Fabbricante